

CIUDADES DEL ESTUDIO



UBICACIONES ACTUALES

UBICACIONES FUTURAS
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA ANCHORSTUDY.ORG

“NADIE SABÍA QUE EL CÁNCER CERVICAL PODRÍA SER PREVENIDO ANTES DE QUE EL CERNIMIENTO Y EL TRATAMIENTO DE LAS CÉLULAS PRECANCEROSAS SE GENERALIZARA EN LOS AÑOS 60S Y SE REDUJERA LA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD POR UN 80 POR CIENTO.”

—Dr. Joel Palefsky, Investigador Principal

VISITA EL SITIO WEB
ANCHORSTUDY.ORG

LLAMA UNIVERSIDAD DE MIAMI
305.243.5012



¿ESTÁ RECIBIENDO TU TRASERO SUFICIENTE ATENCIÓN?



¿DE QUÉ SE TRATA ESTE ESTUDIO CLÍNICO?

El estudio ANCHOR está reclutando voluntarios para ayudarnos a determinar si la detección temprana y el tratamiento de áreas precancerosas del ano podrían prevenir cáncer anal.

Necesitamos que participen 5,058 hombres y mujeres con VIH. Si usted es elegible y está dispuesto, usted será aleatorizado y entonces será tratado o monitoreado cada 6 meses por 5 años.

Las lesiones que pueden causar cáncer anal (HSIL en inglés) están presentes en por lo menos la mitad de los hombres infectados con VIH y en un 20% de mujeres infectadas con VIH. Estas lesiones no tienen síntomas. Se sabe que en las mujeres, tratar HSIL en la cervix puede prevenir cáncer, y así esperamos que tratar estas lesiones en el ano también podrá prevenir cáncer. Pero esto todavía no está comprobado, y por lo tanto la mayoría de los doctores en los Estados Unidos no detectan or tratan HSIL.

El cáncer anal es más común en las personas con VIH que en las personas de la población general. Si es detectado temprano, el cáncer anal es fácilmente tratado, con menos efectos secundarios. ¿Pero quién quiere cáncer anal cuando este podría ser prevenido?

¿CÓMO CALIFICO PARA PARTICIPAR?

- ✓ **VIH+**
- ✓ **35 años de edad o mayor**
- ✓ **Nunca has sido vacunado contra el VPH (Virus del Papiloma Humano)**
- ✓ **Tienes HSIL (nosotros haremos la prueba)**
- ✓ **Nunca has sido tratado para HSIL anal**
- ✓ **Nunca has tenido cáncer del ano, vulva, vagina, o cuello uterino (cervix)**

50% DE LOS HOMBRES CON VIH TIENEN CÉLULAS ANALES PRECANCEROSAS Y LA MAYORÍA NO TIENEN SÍNTOMAS

EN MUJERES CON VIH, LAS CÉLULAS PRECANCEROSAS ANALES SON MÁS COMUNES QUE LAS CÉLULAS PRECANCEROSAS CERVICALES

ES MÁS FÁCIL TRATAR EL CÁNCER DE ANO CUANDO SE DETECTA TEMPRANO, ANTES DE QUE LOS SÍNTOMAS SE DESARROLLEN

PUEDES ESTAR EN RIESGO DE CÁNCER ANAL INCLUSO SI NUNCA HAS TENIDO SEXO ANAL

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA ANCHORSTUDY.ORG

